

帯状疱疹後神経痛に対する柴苓湯の効果

東邦大学医学部 第二脳神経外科

静岡赤十字病院 脳神経外科*

吉井信夫, 牛久保行男, 山田 史*

要旨： 帯状疱疹後神経痛 (PHN) の亜急性期症例26例と慢性期症例25例にツムラ柴苓湯を投与し、亜急性期症例には有効以上69.1%、慢性期症例には60%の成績を得た。慢性期症例は自然治癒が期待し難く難治性疼痛とされ、種々の薬剤、神経ブロック、レーザー治療、手術的治療などが試みられているが、その成績は必ずしも期待通りではない。ここでは西洋薬の効果のなかった慢性期症例25例中15例に、柴苓湯経口投与により良好な成績を得たので亜急性期症例26例と併せて報告した。なお薬剤による副作用は2例で心窩部不快感が出現したのみであった。

索引用語： 帯状疱疹後神経痛, 漢方療法, 柴苓湯

Effect of Sairei-to (Kampo medicines) on the cases of subacute and chronic stages of PHN

Nobuo Yoshii, Yukio Ushikubo and Fumito Yamada*

Second Department of Neurosurgery, Toho University, School of Medicine

Department of Neurosurgery, Shizuoka Red Cross Hospital*

Abstract : Sairei-to is used on PHN for pain relief. Effect of Sairei-to on 26 cases of subacute stage is as follows ; excellent 9, good 9, fair 6 and poor 2. Another study of Sairei-to of chronic stage on 25 cases of PHN, result is as follows ; excellent 10, good 5, fair 8 and poor 2. It is found that the Sairei-to is good for relief of pain of PHN. Side effect of Sairei-to is discomfort in epigastric region only 2 cases.

Key words : post-herpetic neuralgia (PHN), Kampo medicine, Sairei-to