

## 抜歯後に発症した顔面カウザルギー

東京医科大学霞ヶ浦病院 麻酔科

立原弘章, 伊藤樹史, 須田高之, 浜田勝男, 柳田国夫  
安部雄大, 白石修史, 福留健之, 矢数芳英

**要旨:** 歯槽膿漏の診断で某歯科医院にて左大臼歯を抜歯。その直後から移動性の顔面痛を生じ、治療に難渋した症例について報告する。患者は、疼痛根治治療を目的として頻回の手術を受けたにもかかわらず疼痛の移動、増悪を呈し、一過性の薬剤性肝障害をも招いた。痛みは軽い接触で誘発される三叉神経痛様の電撃痛で、慢性疼痛の様相を示し、QOLの著しい低下を呈した。治療としては、星状神経節ブロック、癬痕部局所浸潤注射(トリガーポイントブロック)、漢方薬(ツムラエキス剤)の併用を試みた。

使用した漢方方剤は、桂枝加朮附湯、芍薬甘草湯、五苓散(各々を7.5g/日)で、変方しつつ用い、修治附子末を1.5~3.0g/日と徐々に増量した。これらの治療により患者は辛うじて鎮痛に向かい、QOLの改善も認められた。

**索引用語:** 抜歯, カウザルギー, 星状神経節ブロック, トリガーポイントブロック, 漢方薬治療, 柴苓湯, 修治附子末

Facial causalgia developing following to tooth extraction

Hiroaki Tachihara, Tatsusi Itoh, Takayuki Suda, Katsuo Hamada, Kunio Yanagita  
Yudai Abe, Shuji Shiraishi, Takeshi Fukutome and Yoshihide Yakazu  
Department of Anesthesiology, Kasumigaura Hospital, Tokyo Medical College

**Abstract:** We report on a case of migratory facial causalgia that resisted to standard treatment. The condition developed immediately after extraction of a left molar with a diagnosis of gingival abscess at a dental clinic. In spite of repeated surgery for radical treatment, the pain merely migrated and exacerbated. In addition, the patient developed transient drug-induced hepatic disorder. It was a trigeminal neuralgia-like fulgurant pain, which was triggered by a light touch. It was progressing to a chronic pain, causing a marked reduction in the patient's QOL. Stellate ganglion block and local, infiltrative injection to the cicatricial region were combined with administration of Kampo medicine. The Kampo medicine, composed of Keishi-ka-jutsu-to, Shakuyaku-kanzo-to and Gorei-san (each 7.5g/day), was administered. The prescription was varied and 1.5 to 3.0g/day of Shuchi-Bushi Powder was added in an increasing proportion. This treatment led to gradual analgesia and an improvement in his QOL.

(原稿受付 1993年12月24日)