

症 例 報 告

外傷性坐骨神経痛に当帰芍薬散が有効であった1例

鈴木圭子 北島敏光

濁協医科大学第一麻酔学教室

要旨：症例は42歳，女性。落下してきた鉄骨を無理な体勢でよけた直後から腰部と左下肢に疼痛が出現し，次第に歩行困難となった。整形外科にて外傷性坐骨神経痛と診断され治療を受けたが，症状の改善は見られなかった。受傷約半年後に当科に入院となり，持続硬膜外ブロック，仙腸関節ブロックを行って疼痛は減少したが，患者が満足する程の疼痛軽減は得られず，めまいの出現を契機にブロック治療と平行して漢方薬の処方を開始した。本症例は，めまい，耳鳴，下肢の冷え，不眠といった血虚，瘀血及び水毒が以前よりあり，当帰芍薬散を処方した。投薬後，めまいや足部の冷えが消失し，熟睡ができるようになり，これに伴い疼痛も軽減していった。当帰芍薬散が体質の偏向を改善し，随伴症状を取り除くことにより，ブロック治療の効果を高めたと考えた。

索引用語：外傷性坐骨神経痛，当帰芍薬散，神経ブロック

A case of post-traumatic sciatica effectively treated with Toki-shakuyaku-san

Keiko Suzuki, et al.

First Department of Anesthesiology, Dokkyo University School of Medicine

Abstract : A 42-year-old female felt pain in the left buttock and leg after she twisted her body at the waist to dodge a falling object. She could not walk because of severe pain. She was treated by the orthopedist, but the treatment did not relieve her pain. She was referred to our clinic and underwent lumbar epidural block and a left sacroiliac joint injection with local anesthetics. After the treatment, her pain relief score decreased from 10 to 5, but she was not satisfied with the result.

Since we found Oketsu and Suidoku syndromes in this patient, we treated with Toki-shakuyaku-san according to "Sho" based on by Kampo diagnosis. Her symptoms were gradually alleviated after taking the Kampo medicine.

Key words : Post-traumatic sciatica, Toki-shakuyaku-san