

短報

## 治療に難渋している頸部郭清術後の創部痛の1例

佐藤 恭道

大熊 毅 別部 智司

三浦 一恵 雨宮 義弘

鶴見大学歯学部歯科麻酔学教室

要旨：顎顔面および口腔の審美的、機能的障害が起こる口腔癌の根治術後は、特に術後の疼痛管理や心理的バックアップが重要である。今回我々は、舌癌根治療法術後の難治性疼痛治療にあたったので報告する。

症例は54歳、女性。1994年8月、某病院にて左側舌癌の診断で左側舌亜全摘出術、左側全頸部郭清術、大胸筋皮弁による即時再建術が行われた。96年7月、左側頸肩部から前胸部、および舌の持続的疼痛を主訴に当科を受診した。全身的には冷え症で、易疲労感、動悸や不眠、のぼせ、胸脇苦満が認められた。そこでツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯を処方し、入眠剤と鎮痛薬の頓服使用を許可した。来院時にはペインポイントブロックを行い、精神的なケアにはロゴセラピーを行った。現在では、服薬状況はやや改善され、精神的にも安定してきている。疼痛は難治ではあるものの著しい訴えは減少し、寛解してきている。

索引用語：術後痛、漢方薬、柴胡加竜骨牡蛎湯、ロゴセラピー、頸部郭清術、再建術

### An intractable case of scar pain after neck dissection

Yasumichi Sato, Takeshi Ohkuma, Satoshi Beppu, Kazue Miura and Yoshihiro Amemiya

Department of Dental Anesthesiology, Tsurumi University, School of Dental Medicine

**Abstract** : A radical operation for oral cancer causes functional and aesthetical impairment of oro-facial region. It is therefore important to back up the patient's mental state and control pain. We report a case of intractable pain after neck dissection. A 54-year-old woman received an operation of partial excision of the tongue, neck dissection and reconstruction with pectoralis major myocutaneous flap under the diagnosis of tongue cancer. She visited the pain clinic of our hospital 2 years after the operation because of severe pain at the scar. The patient presented cold constitution, exhaustion, palpitation, insomnia, hot flush and tenderness of hypochondriac region. Then, we treated the patient comprehensively, mainly using Kampo medicine (Saiko-ka-ryukotsu-borei-to), a pain point block with a local anesthetic and mental care conducted according to the logotherapy. Now, pain has slightly reduced and the patient has been psychosomatically stabilized.

**Key words** : Postoperative pain, Kampo medicine, Saiko-ka-ryukotsu-borei-to, Logotherapy, Neck dissection, Reconstruction