

症 例 報 告

三黄瀉心湯が有効であった
下垂足を伴った腰部脊柱管狭窄症の1例

穴吹弘毅*

要旨：72歳女性。腰部脊柱管狭窄症にて平成8年頃から間欠性跛行100m、平成9年頃から右下垂足となり、近医加療するも症状改善せず、平成13年6月当院を受診した。受診時、間欠性跛行30mであった。オパルモンの内服、各種ブロック注射、点滴、リハビリテーションを行うも症状の改善がなかった。平成14年5月から、頭痛、のぼせ、高血圧、便秘の改善のために三黄瀉心湯エキス顆粒7.5g、分3／日を開始した。投与後3週で、間欠性跛行200mに改善し、2ヵ月後に間欠性跛行300mに、3ヵ月後には間欠性跛行400mに改善した。平成15年9月には、1km歩行可能となった。頭痛、のぼせ、便秘、肩凝りなども改善したが、偶然ではあったが、間欠性跛行も改善した。漢方の随証治療によって思わぬ効果が期待できることにあらためて感激した。

索引用語：腰部脊柱管狭窄症、三黄瀉心湯、間欠性跛行

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.15 (2005)

Effect of san'oshashinto (TJ-113) on
Intermittent Claudication with Lumbar Canal Stenosis (LSCS)
Koki Anabuki*

Abstract: The author reports a remarkable effect of san'oshashinto on intermittent claudication with lumbar canal stenosis in a 72-year-old woman. She visited her family doctor nearby but the symptoms did not subside. I administered san'oshashinto to relieve her headache, flush, constipation, stiff neck. Intermittent claudication was improved remarkably in several weeks. It is very important to judge an individual's Sho according to Kampo medicine. We were deeply impressed with the fact that we could expect accidental effects of Kampo medicine by judgment of Sho.

Key words: Lumbar Canal Stenosis (LSCS), San'oshasinto (TJ-113), Intermittent Claudication

* Department of Orthopedic Surgery, Fuji Toranomon Hospital

Offprint requests to: Koki Anabuki, Department of Orthopedic Surgery, Fuji Toranomon Hospital, 1067-1, Kawashima, Gotenba-city, Shizuoka Pref. 412-0045, Japan