

症 例 報 告

難治性の外傷性頸部症候群に対する漢方治療

穴吹弘毅*

要旨：難治性の外傷性頸部症候群に対して行った加味逍遙散（TJ-24）を中心とする漢方治療の結果を報告する。交通外傷にて加療後2カ月以上経過するも諸症状の残存した14例（男性2例、女性12例）、平均年齢39歳（23～62歳）であった。内服薬は漢方薬単独の例は8例であった。内服後2週間で全く効果のなかった場合は次々と処方を変更した。途中星状神経節ブロックを行った例が3例、点滴、トリガー注射を行った例が6例であった。漢方薬による治療期間は平均5.5カ月（2週～14カ月）であった。最終的にVAS（Visual Analog Scale）が2以下を効果有りと判定した。14例中11例に一度はTJ-24を単剤あるいは合方で使用しており、7例で症状は改善した。TJ-24は肝気鬱結（熱証）の冷えに対して効果があるが、外傷性頸部症候群の患者にはこの証が多いようである。

索引用語：外傷性頸部症候群、加味逍遙散、頸部痛

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.17 (2007)

Effect of kamishoyosan for injury-related cervical injury

Koki Anabuki*

Abstract: We report the results of a Chinese medicine treatment mainly with kamishoyosan for an intractable traumatic cervical syndrome.

We had 14 cases (2 male patients, 12 female patients), average age of 39 (23-62 years old) where many symptoms remained though more than two months had already passed after medical treatment for traffic injury, and 8 patients were treated only with the Chinese medicine. Duration of the treatment with the Chinese medicine was 5.5 months on average (from 2 weeks to 14 months), and lower than 2 was judged effective on a VAS (Visual Analog Scale). kamishoyosan was used for 11 out of 14 patients as a single agent or with an accompaniment of samisens, and symptoms were improved in 7 patients.

TJ-24 seems to help identify many patients with injury-related cervical syndrome.

Key words: kamishoyosan, neck pain, cervical injury

* Department of Orthopedics, Seki Hospital

Offprint requests to: Koki Anabuki, Department of Orthopedics, Seki Hospital, 1-3 Midoricyo, Mishima-city, Shizuoka 411-0848, Japan