

症 例 報 告

左手の難治性疼痛 (RSD) に 当帰四逆加呉茱萸生姜湯が著効を呈した 1 例

須藤和昌*¹ 田島康敬*¹ 松本昭久*¹ 田代邦雄*²

要旨：3年半の経過をもつ I-IV 指優位の左手の難治性冷感，疼痛，しびれを訴える 77 歳女性の RSD 例に対し，漢方医学的見地から当帰四逆加呉茱萸生姜湯を投与した．開始後 1 カ月ほどで長年の便秘の改善とともに症状が軽快し，11 カ月後に他剤を追加し当帰四逆加呉茱萸生姜湯の服用が不規則になると症状が悪化したため，前処方に戻したところ再び改善を得た．本処方の深部，末梢にわたる血流改善作用により血虚の改善が得られ，それを介して効果を現したことが推測される．慢性の四肢，体幹，腹部の血行障害と慢性の疼痛が合わさって互いの症状を増幅させ合っている例で，本剤はふさわしいと思われる．さらに本剤は RSD のような局所に症状の出る例でも，臨床症候と患者の証を参考にしながら処方すれば著効を得られる可能性があることを示すものと思われる．

索引用語：当帰四逆加呉茱萸生姜湯，反射性交感神経性ジストロフィー (RSD)，難治性疼痛，手，サーモグラフィー

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.18 (2008)

The effect of tokishigyakukagoshuyushokyoto in a case with reflex sympathetic dystrophy in her left hand

Kazumasa Sudo *¹, Yasutaka Tajima *¹, Akihisa Matsumoto *¹ and Kunio Tashiro *²

Abstract: We report that a 77-years-old woman with reflex sympathetic dystrophy in her left hand was successfully treated with tokishigyakukagoshuyushokyoto. She was suffering from progressive severe pain in her left hand accompanied by serious cold sensation. The pain was refractory instead of prescribing various medicines and the decompression of the carpal tunnel. The pain, however, resolved in one month after she began to take tokishigyakukagoshuyushokyoto. The resolution was also confirmed by serial thermography. We consider that this prescription should be considered in cases with limb and/or truncal pain even if it is localized.

Key words: tokishigyakukagoshuyushokyoto, reflex sympathetic dystrophy, refractory pain, hand, thermography

*¹ Department of Neurology, Sapporo City General Hospital

Offprint requests to: Kazumasa Sudo, Department of Neurology, Sapporo City General Hospital, Kita 11, Nishi 13, Chuo-Ku, Sapporo, Hokkaido 060-8604, Japan

*² Health Sciences University of Hokkaido