

症 例 報 告

直腸癌局所再発による下肢痛緩和に対し
芍薬甘草湯が有効であった2例

円城寺昭人*¹ 井上効子*¹ 原真一郎*¹ 松永 薫*¹ 樋渡輝代*¹ 釘本とよ子*¹
野島志乃*¹ 中島佐知子*¹ 新郷知子*¹ 下田 薫*¹ 宮本雄一*¹ 佐藤英俊*²

要旨：症例1：71歳男性。症例2：61歳男性。いずれの症例も直腸癌にて腹会陰式直腸切断術を施行後、骨盤腔内に局所再発した。再発により臀部から下肢に及ぶ癌性疼痛を訴え、オピオイドおよび各種鎮痛補助薬を使用した。疼痛コントロール不良であった。芍薬甘草湯（TJ-68）を併用し投与したところ有効であった。がん性疼痛は痛みの性質がさまざまです。特にこむらがり様の疼痛などには芍薬甘草湯などの漢方が奏効する可能性がある。

索引用語：直腸癌再発、癌性疼痛、下肢痛、芍薬甘草湯

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.19 (2009)

Effects of shakuyakukanzoto on severe leg pain
due to the recurrence of rectal cancer in two cases

Akihito Enjoji *¹, Koko Inoue *¹, Shinichiro Hara *¹, Kaoru Matsunaga *¹,
Teruyo Hiwatashi *¹, Toyoko Kugimoto *¹, Shino Nojima *¹, Sachiko Nakashima *¹,
Tomoko Shingo *¹, Kaoru Shimoda *¹, Yuichi Miyamoto *¹ and Sato Hidetoshi *²

Abstract: Two cases those had pelvic recurrence of rectal cancer after abdominoperineal resection are shown. Both of them complained of severe leg pain due to the involvement of pelvic nerve. Their pain was uncontrollable by opioid or various analgesic adjuvant. Shakuyakukanzoto (TJ-68) was suggested to improve the leg pain caused by pelvic recurrence of rectal cancer.

Key words: shakuyakukanzoto, rectal cancer, Lower limb pain, local recurrence

*¹ National Hospital Organization Saga National hospital

Offprint requests to: Akihito Enjoji, National Hospital Organization Saga National hospital.
1-20-1, Hinode, Saga, 849-0923, Japan

*² Department of Community-based Comprehensive Palliative, Care Saga Medical School Hospital, Saga University