

症 例 報 告

抑肝散 (TJ-54) 有効だった 高齢の神経障害性疼痛患者 2 症例

湯澤 則子* 小野 玲子* 河西 稔*

要旨: 神経障害性疼痛の薬物治療では、抗鬱薬・抗痙攣薬・抗不安薬などが中心となる。しかし高齢の患者では、これらの薬剤に対する安全域が狭く、副作用が出現しやすい。薬剤の副作用が出現した高齢の神経障害性疼痛患者に対し、抑肝散を投与し、副作用なく、良好な結果を得られた 2 症例について報告する。

また、抑肝散は近年その作用機転が徐々に明らかになってきており、認知症や神経障害性疼痛、せん妄治療での効果についての報告がされている。それらの文献的考察を加え、高齢の神経障害性疼痛患者に対する抑肝散の有用性を検討した。

索引用語: 抑肝散(TJ-54), 高齢者, 神経障害性疼痛

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.21 (2011)

Two cases report that yokukansan was effective for the neuropathic pain in the aged patients.

Noriko Yuzawa*, Reiko Ono* and Minoru Kawanishi*

Abstract: In the standard drug therapy of neuropathic pain, antidepressant, anticonvulsant or antianxiety drug is used. But in aged patients, the safety region of medicine is narrow, and they sometimes show the adverse effects such as dizziness, falling, drowsiness and/or nausea. We reported that yokukansan (TJ-54) was effective for the neuropathic pain in the aged patients who showed adverse effects induced by the western drug.

Key words: neuropathic pain, yokukansan(TJ-54), aged patients

* Department of Anesthesia and Pain Clinic, Banbuntane Hotokukai Hospital of Fujita Health University of Medicine
Offprint requests to: Noriko Yuzawa, Department of Anesthesia and Pain Clinic, Banbuntane Hotokukai Hospital of Fujita Health University of Medicine. 3-6-10 Otobashi Nakagawa-ku Nagoya City