

## 症 例 報 告

小脳橋角部腫瘍術後に発症した対側顔面痛に  
桂枝加朮附湯と呉茱萸湯が有効であった症例

内 菌 明 裕\*

**要旨：**筆者は、小脳橋角部腫瘍術後に発症した、腫瘍病側とは対側の右顔面痛（眼周囲痛）を呈した症例を経験し、漢方薬を用いて疼痛を緩和することが出来たので報告する。症例は、57歳女性で、既往歴や生活歴に特記すべきことはない。初診はX-1年5月で、当初の訴えは、口中および舌尖部のピリピリ感であった。1ヵ月後の受診時に、2週間前に出現した急性の左難聴を訴え、MRIの結果、左小脳橋角部に腫瘍を認めたために、他院の耳鼻咽喉科および脳神経外科に紹介し、腫瘍摘出術が施行された。術後半年より、術側と対側の右目の周囲から鼻根部の断続的な疼痛が出現するようになった。器質的な異常を認めず、非ステロイド系消炎鎮痛剤を処方され頓用していたが、疼痛が頻発するためにX年6月に当院を再受診した。漢方学的診断に基づき、桂枝加朮附湯（TJ-18）を処方したところ、10日ほどの処方後、痛みの回数や程度に改善が認められた。気温の低下に伴い再燃したが、呉茱萸湯（TJ-31）を併用することで疼痛が改善し、約9ヵ月後に廃薬に至った。

**索引用語：**桂枝加朮附湯、呉茱萸湯、術後疼痛

## PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.21 (2011)

A case of postoperative facial pain on opposite side treated with  
keishikajutsubuto and goshuyuto

Akihiro Uchizono \*

**Abstract:** Analgesic effects of keishikajutsubuto (TJ-18) and goshuyuto (TJ-31) on the opposite side facial pain after an operation of left side cerebellopontine angle tumor was reported.

The patient was a 57-year old woman suffering from tense feeling of the mouth and tongue tip. One month later, she complained of the left sudden hearing loss onset two weeks before. By the examination using MRI, a large tumor was revealed on the left cerebellopontine region. She was introduced to the other hospital and the operation was performed.

Nine months later, she visited my clinic suffering from the severe right facial pain starting 6 months after the operation. Some examinations did not reveal any tumor and abnormality. According to the kampo diagnosis, TJ-18 and TJ-31 were administrated to treat her pain. It was gradually decreased in 6 months, and the administrating of medication became unnecessary 9 months later.

**Key words:** keishikajutsubuto, goshuyuto, postoperative facial pain

\* Sendai ENT clinic

Offprint requests to: Akihiro Uchizono, Sendai ENT clinic.

1945-1 Takityo, Satsumasendai city, Kagoshima 895-0211, Japan