

短報

腫瘍再発に対する不安により発症した胸背部痛に 漢方治療が奏効した 1 症例

竹内 健二*¹ 角山 倫子*¹ 伊佐田哲朗*¹ 斎藤 律子*¹
新江 聡*¹ 守屋 純二*² 山川 淳一*²

要旨：腫瘍再発に対する不安から生じた胸背部痛に対して、漢方治療が奏効した 1 例を経験した。症例は 74 歳の女性で、200X-5 年に右肺癌に対して右上葉切除術を受けた。200X-1 年、術後フォロー中に血液検査にて腫瘍マーカー上昇、胸部 CT 上、前回手術部近傍に結節陰影出現を認めたが、確定診断できず経過観察となった。それから腫瘍再発の不安から不眠気味となり、同時に背部の違和感も自覚し、徐々に移動性の季肋部痛も伴うようになった。腫瘍再発の不安が気鬱を生じ、交感神経の緊張により脊柱起立筋の筋緊張をもたらし、痛みの悪循環を生じ徐々に疼痛を悪化させたと思われた。そこで随証治療として、四逆散を処方し疼痛を軽減することができた。気鬱の改善を目標とした漢方治療が、痛みの悪循環を遮断し、腫瘍再発に対する不安から生じた胸背部痛を消失させたと考えられた。

索引用語：肋間神経痛、四逆散、気鬱

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.21 (2011)

Effect of Kampo medicine on the pain in the back and subcostal area occurred from the fear of the recurrence of cancer

Kenji TAKEUCHI *¹, Michiko KAKUYAMA *¹, Tetsuro ISADA *¹, Ritsuko SAITO *¹,
Satoshi SHINE *¹, Junji MORIYA *² and Junichi YAMAKAWA *²

Abstract: A patient was 74-year-old female with intercostal neuralgia. She is suffering from the fear of the recurrence of cancer. Gradually she had depressed sensation, insomnia and pain in the back and subcostal area. The administration of shigyakusan for ten days, all symptoms were disappeared. It was suggested that the treatment of shigyakusan that aimed at the improvement of both the relaxation of muscle and the improvement of depressed sensation should improved the pain that occurred from the fear of the recurrence of cancer.

Key words: intercostal neuralgia, shigyakusan, stress management

*¹ Department of Anesthesiology, Fukui Saiseikai Hospital

Offprint requests to: Kenji TAKEUCHI, Department of Anesthesiology, Fukui Saiseikai Hospital,
7-1, Funabashi, Wadanaka-cho, Fukui 918-8503, Japan

*² Department of General Medicine, Kanazawa Medical University