

短 報

## 下腿潰瘍の難治性疼痛に対し，トラマドール・アセトアミノフェン配合錠，芍薬甘草湯の併用により良好な疼痛コントロールが得られた1症例

棚田大輔\* 村川和重\* 中野 範\* 神原政仁\*  
福永智栄\* 池田和世\* 恒遠剛示\*

**要旨：**血管ベーチェット病に合併した下腿潰瘍難治性疼痛に対し，トラマドール・アセトアミノフェン配合錠，芍薬甘草湯の併用により良好な疼痛コントロールが得られた1症例を経験した。症例は32歳の女性，下腿足背潰瘍難治性疼痛にて当科を受診。Drug challenge testの結果によりメキシチール，トラマドール・アセトアミノフェン配合錠処方にて全体的な痛みは改善したが，足がつるような痛みがあるとのことで芍薬甘草湯を追加し，良好な疼痛緩和が得られた。強度の侵害受容性疼痛により，マスクされていた筋緊張性の疼痛増悪因子に対して芍薬甘草湯を併用することで，良好な疼痛コントロールが得られたものと考えられる。

**索引用語：**血管ベーチェット病，下腿潰瘍難治性疼痛，芍薬甘草湯，トラマドール

### PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.23 (2013)

#### A case of vasculo-Behcet' s disease oriented leg ulcer pain controlled with tramadol-acetaminophen combination tablet and shakuyakukanzoto.

Daisuke Tanada\* Kazushige Murakawa\* Susumu Nakano\* Masahito Kamihara\*  
Tomoe Fukunaga\* Kazuyo Ikeda\* and Takashi Tsunetoh\*

**Abstract:** We experienced a case, 32-year-old women suffered from vasculo-Behcet' s disease oriented leg ulcer pain which was well treated with both the tramadol-acetaminophen combination tablet and shakuyakukanzoto. The women visited our department with intractable leg ulcer pain. Mexiletin hydrochloride and tramadol-acetaminophen combination tablet were prescribed based on the result of the drug challenge test. Next, shakuyakukanzoto was prescribed for remaining pain like a leg stretches, and the pain was improved. It was suggested that pain control should be obtained from the additive treatment with shakuyakukanzoto in patient with the sharp pain precipitating factor of the muscle stress nature in which masked by the strong nociceptive pain.

**Key words:** vasculo-Behcet' s disease, leg ulcer pain , shakuyakukanzoto, tramadol

---

\* Department of Pain Medicine Hyogo college of Medicine

*Offprint requests to:* Daisuke Tanada, Department of Pain Medicine Hyogo college of Medicine.

1-1, Mukogawa-cho, Nishinomiya City, Hyogo, 663-8501, Japan