症例報告

冷えにより生じたと思われる季肋部痛に漢方処方が 奏効した1症例

要旨:冷えにより悪化した腹部症状に対して、痛みの部位を考慮し温裏薬を転方する事により、痛み軽減をみた症例を経験した、症例は74歳の男性で、右季肋部痛を主訴として当科を受診した、血液検査・胸椎単純 X 線撮影・腹部 CT 検査・消化管内視鏡検査にて異常所見は認めず、西洋医学的には原因は特定できなかった。東洋医学的に診断し、冷えにより誘発された各種疼痛と判断し当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス、呉茱萸湯エキス、修治ブシ末を投与し諸症状の改善をみた、しかしながら寒さが厳しくなるにつれ両側季肋部痛が悪化し、放屁が多くなるなど腹部症状の変化もみられてきた為、当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスを当帰湯エキスに変方した。当帰湯エキスに変方後、季肋部痛は徐々に軽減し2週間後にはほぼ認めなくなった。当帰湯は構成生薬から人参湯・大建中湯の方意を含み、当帰四逆加呉茱萸生姜湯よりも裏寒に対する改善作用がより強いと思われる。冷えに伴う体幹部の痛みに対して、当帰四逆加呉茱萸生姜湯が無効な場合には、当帰湯も考慮すべきと思われた。

索引用語:季肋部痛,冷え,当帰湯

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.25 (2015)

Successful treatment with kampo medicines of a patient suffering from hypochondralgia due to cold constitution

Kenji TAKEUCHI*¹, Michiko KITAMURA*¹, Tetsuro ISADA*¹, Ritsuko SAITO*¹, Satoshi SHINE*¹, Junji MORIYA*² and Junichi YAMAKAWA*²

Abstract: Patient was a 74-year-old male suffering from various pain due to cold constitution. The combined administration of tokishigyakukagoshuyushokyoto, goshuyuto and heat processed aconite tuber (bushimatsu) improved all pain temporarily. However, as cold became severe, bilateral hypochondralgia worsened. So tokito was administered instead of tokishigyakukagoshuyushokyoto. About two weeks after the administration of tokito, the pain was gradually disappeared. It was suggested that tokito should be effective for hypochondralgia due to cold constitution.

Key words: hypochondralgia, tokito, cold constitution

 ^{* 1} Department of Anesthesiology, Fukui Saiseikai Hospital
Offprint requests to: Kenji TAKEUCHI, Department of Anesthesiology, Fukui Saiseikai Hospital.
7-1 Funabashi, Wadanaka-cho, Fukui-shi, Fukui 918-8503, Japan

^{* &}lt;sup>2</sup> Department of General Medicine, Kanazawa Medical University