

症 例 報 告

後腹膜腫瘍術後の遷延する痛みに対して
治打撲一方が奏効した2症例

矢部充英* 河合茂明* 山崎広之* 舟尾友晴* 西川精宣*

要旨:後腹膜腫瘍術後に遷延する痛みに対して治打撲一方が奏効した2症例を経験した。症例1:70歳代,女性。腹腔鏡補助下両側付属器摘出術と開腹下後腹膜腫瘍摘出術を施行1年後から,股関節屈曲時に右下腹部から股関節にかけて鋭い痛みを自覚するようになった。治打撲一方(TJ-89)を5g分2/日で開始したところ,2週間後には日常生活に支障ない程度に軽快した。症例2:40歳代,男性。後腹膜腫瘍切除術後,坐骨神経領域に痛みが残存,フェンタニル貼付剤(FP)で鎮痛をはかっていたが,徐々にFPの持続時間が短くなり,ビリビリした持続痛が残存していた。治打撲一方を5g分2/日で開始したところ,2週間後には痛みは30%程度軽減し,FPの持続時間も延長した。

治打撲一方は7つの生薬から構成され,薬効はその抗炎症作用,抗酸化作用および駆瘀血作用によると考えられている。治打撲一方は術後の遷延する痛みに対しても一部の症例では有効である可能性が示唆された。

索引用語: 治打撲一方, 術後遷延性疼痛, 難治性疼痛

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.28 (2018)

Jidabokuippo was effective for chronic postsurgical pain after resection of a retroperitoneal tumor: a report of two cases

Mitsuhide YABE*, Shigeaki KAWAI*, Hiroyuki YAMASAKI*,
Tomoharu FUNAO* and Kiyonobu NISHIKAWA*

Abstract: Chronic postsurgical pain is a common problem after surgery, and may substantially decrease the patient's quality of life. Jidabokuippo may have antioxidative and anti-inflammatory effects, and relief of blood stasis. The first case was a woman in her 70s. She had laparoscopic bilateral oophorectomy and open abdominal resection of a retroperitoneal tumor. After one year of the surgery, sharp pain in her right-side lower abdomen during hip joint flexion was developed. Administration of 5g/day Jidabokuippo was effective. The second case was a man in his 50s. He had resection surgery for treatment of a retroperitoneal tumor. 9 months after the operation, shooting pain in his lower leg was remained. Administration of 5g/day Jidabokuippo yielded approximately 30%-pain relief. Jidabokuippo may be an effective treatment for some cases of chronic postsurgical pain.

Key words: chronic postsurgical pain, Jidabokuippo, intractable pain

*¹ Department of Anesthesiology, Osaka City University Graduate School of Medicine

Offprint requests to: Mitsuhide YABE, Department of Anesthesiology, Osaka City University Graduate School of Medicine.

1-5-7 Asahimachi, Abenoku, Osaka 545-8586, Japan