非定形胸痛に駆瘀血剤を投与し有効であった3症例

斉藤寛史*

要旨: 労作性狭心症で血行再建後も残存する非定型胸痛に対して駆瘀血剤を投与し症状の改善をみた. 心電図や運動負荷心筋シンチグラム, BMIPP 心筋シンチグラム検査で虚血所見を認めない非定型胸痛は瘀血と考え治療することは有用である.

索引用語:非定型胸痛, 瘀血, 駆瘀血剂

PAIN AND KAMPO MEDICINE Vol.28 (2018)

Three Cases of Atypical Chest Pain Successfully Treated with Kampo Formulas Eliminating Blood Stasis

Hiroshi SAITO*

Abstract: Kampo formulas eliminating blood stasis were administered to atypical chest pain remaining after circulation revascularization with exertional angina pectoris and symptomatic improvement was observed. It is useful to treat atypical chest pain which does not have ischemic findings in electrocardiogram, exercise load myocardial scintigram, BMIPP myocardial scintigram examination as blood stasis.

Key words: atypical chest pain, blood stasis, Kampo

Offprint requests to: Hiroshi SAITO, Minori Clinic.

22-6-2F Ogawa-chou, Kagoshima-shi, Kagoshima 892-0817, Japan

^{*} Minori Clinic